

Publicerad 2012-02-16 22:55 av Jaramald

Jag har gått en längre tid på antibiotika...

MRSA (Mycket Reaktiva Samhällskritiska Aforismer)

Schema för att upptäcka transient (tillfälligt) bärarskap av MRSA

Transient (tillfälligt) bärarskap av MRSA d.v.s. ett enda positivt MRSA prov i näsa eller svalg hos hudfrisk person utan riskfaktorer följt av tre negativa screening prov. Inget etablerat bärarskap av MRSA. Inga förhållningsregler ska utfärdas och om det skett ska de avskrivas.

- Vid första positiva odlingen i enbart näsöppning/svalg. Anmälan i SmiNet av provtagande läkare.
- Enbart preliminära förhållningsregler i avvaktan på bedömning om transient bärarskap föreligger. Avvakta med märkning i journalen.
- Vid efterföljande tre negativa prover. Gör en kompletterande anmälan i SmiNet och informera att det gällde ett transient bärarskap.
- Informera noggrant i journalen att patienten inte räknas som MRSA bärare och förklara det även för patienten. Skriv gärna ett brev till patienten
- Patienten bedöms i samråd med smittskyddsläkaren och förhållningsregler avskrivs om de är givna förut.

Screening omgångarna tas med 1-2 veckors mellanrum. Antibiotikafrihet 2 veckor före prov. Screening = provtagning från näsöppning, svalg, perineum och eventuella andra lokaler som sår, eksem och andra riskfaktorer.

Aktuellt prov Prov 1 Prov 2 Prov 3

Påvisad MRSA i

näsa eller svalg

Negativ MRSA

screening

Negativ MRSA

screening

Negativ MRSA

screening

Avskriva förhållningsregler vid säkerställt bärarskap av MRSA

Säkerställt bärarskap av MRSA har man om man uppfyller något av nedanstående kriterier

- MRSA i någon annan lokal än näsöppning eller svalg vid ett tillfälle
- MRSA i näsöppning eller svalg vid två eller fler tillfällen

En patient som saknar individberoende riskfaktorer för att bära och sprida MRSA kan bli föremål för avskrivning av förhållningsregler.

Patienten ska ha tre negativa screening omgångar för MRSA under en tidsperiod om minst ett år. Inga positiva prov däremellan.

Screening = provtagning från näsöppning, svalg, perineum. Antibiotikafrihet 2 veckor före provtagning.

Aktuellt prov 1-3 månader 4-6 månader 12 månader

Påvisad MRSA Negativ MRSA

screening

Negativ MRSA

screening

Negativ MRSA

screening

Vid tre negativa MRSA screening omgångar inom minst ett år kan avskrivning av förhållningsregler ske efter samråd med smittskyddsläkaren. Patienten ska inte ha några individberoende riskfaktorer.

Föremål för avskrivning???

Svar

Ja

Positiv utgång.

Texten är utskriven från Poeter.se

Författaren Jaramald med Poeter.se id #17767 innehar upphovsrätten